

Документ подписан при создании задания для диагностического тестирования по дисциплине:

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 11.06.2024 08:04:06

Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1e02674b544998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание

НЕОНАТОЛОГИЯ, 11 СЕМЕСТР

| | |
|-----------------------------|---|
| Код, направление подготовки | 31.05.02 Педиатрия |
| Направленность (профиль) | Педиатрия |
| Форма обучения | очная |
| Кафедра-разработчик | Акушерства, гинекологии и перинатологии |
| Выпускающая кафедра | детских болезней |

| Проверяемая компетенция | Задание | Варианты ответов | Тип сложности вопроса | Кол-во баллов за правильный ответ |
|-------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| ПК-6 | Укажите один правильный ответ При возникновении в роддоме группового инфекционного заболевания новорожденных следует: | А. перевести в наблюдательное отделение и назначить лечение Б. оставить на месте, назначив лечение В. немедленно перевести в соответствующий стационар Г. все ответы правильные Д. вызвать инфекциониста | низкий | 2,0 |
| ПК-6 | Укажите один правильный ответ На каком этапе внутриутробного развития максимален риск грубого повреждения плода: | А. бластогенез Б. эмбриогенез В. ранний фетальный период Г. поздний фетальный период | низкий | 2,0 |
| ПК-6 ПК-8 | Укажите один правильный ответ Первый “перекрест” в лейкоцитарной формуле крови у недоношенных новорожденных происходит: | А. на 4-й день Б. на 5-й день В. на 6-й день Г. после 7-10-го дня | низкий | 2,0 |
| ПК-6 ПК-8 | Укажите один правильный ответ Перинатальную смертность составляют: | А. внутриутробная гибель плодов при сроке беременности 28 недель и более, гибель плодов в процессе родов, гибель | низкий | 2,0 |

| | | | | |
|--------------|---|--|---------|-----|
| | | <p>новорожденных до 28 дней жизни</p> <p>Б. гибель плодов в процессе родов, гибель новорожденных до 7-х суток, гибель новорожденных после 7-х суток внеутробной жизни</p> <p>В. внутриутробная гибель плодов при сроке беременности 22 недель и более, гибель плодов в процессе родов, гибель новорожденных до 7-х суток внеутробной жизни</p> | | |
| ПК-6 ПК-8 | <p>Укажите один правильный ответ</p> <p>Степень дыхательной недостаточности оценивают по следующим признакам:</p> | <p>А. частоте дыхания</p> <p>Б. наличию цианоза</p> <p>В. участию в дыхании вспомогательной мускулатуры и втяжению уступчивых мест грудной клетки</p> <p>Г. всем перечисленным признакам</p> | низкий | 2,0 |
| ПК-6 | <p>Укажите один правильный ответ</p> <p>Время появления физиологической желтухи:</p> | <p>А. 1-е сутки</p> <p>Б. начало 2-х суток</p> <p>В. конец 2-х суток – 3-и сутки</p> <p>Г. после 5-х суток</p> | средний | 5,0 |
| ПК-8 | <p>Укажите несколько правильных ответов</p> <p>Желтуха в период новорожденности является симптомом:</p> | <p>А. гемолитической болезни</p> <p>Б. микседемы</p> <p>В. пилороспазма</p> <p>Г. адреногенитального синдрома</p> <p>Д. внутриутробных инфекций</p> | средний | 5,0 |
| ПК-6 ПК-8 | <p>Укажите один правильный ответ</p> <p>Какой уровень гемоглобина считается нормальным для недоношенного ребенка в возрасте 3 недель?</p> | <p>А. не ниже 120 г/л</p> <p>Б. не ниже 130 г/л</p> <p>В. не ниже 150 г/л</p> <p>Г. не ниже 180 г/л</p> <p>Д. не ниже 200 г/л</p> | средний | 5,0 |
| ПК-6 | <p>Укажите один правильный ответ</p> <p>Основные пути передачи внутрибольничной инфекции:</p> | <p>А. через руки персонала</p> <p>Б. через продукты питания</p> <p>В. через белье</p> <p>Г. через предметы ухода</p> <p>Д. через медицинский инструментарий</p> | средний | 5,0 |
| ПК-6 | <p>Укажите один правильный ответ</p> | <p>А. в коже</p> | средний | 5,0 |

| | | | | |
|--------------|---|--|---------|-----|
| | При флегмоне новорожденных первичный воспалительный процесс локализуется: | Б. в лимфатических сосудах В. в подкожной клетчатке | | |
| ПК-6 ПК-8 | <i>Укажите один правильный ответ</i> При флегмоне новорожденных чаще отмечается: | А. нормальная температура Б. субфебрильная температура В. высокая, 39-40 °С, в первые дни заболевания и резкое ее снижение после некроза клетчатки | средний | 5,0 |
| ПК-6 | <i>Укажите один правильный ответ</i> Основное отличие поражения ЦНС при наследственных нарушениях обмена от поражения ЦНС гипоксического генеза: | А. симптомы поражения с возрастом уменьшаются Б. симптомы поражения с возрастом нарастают В. симптомы поражения носят неспецифический характер Г. симптомы поражения ярко выражены с рождения | средний | 5,0 |
| ПК-6 ПК-8 | <i>Укажите один правильный ответ</i> Возбудителем флегмоны новорожденного является: | А. сапрофитная флора Б. грамотрицательная флора В. простейшие Г. стафилококк | средний | 5,0 |
| ПК-8 | <i>Укажите один правильный ответ</i> Путем передачи ВИЧ-инфекции не является: | А. воздушно-капельный Б. половой В. трансплацентарный Г. гемотрансузионный | средний | 5,0 |
| ПК-6 | 1. <i>Укажите один правильный ответ</i> 2. Какая причина анемий при рождении встречается чаще других: | А. кровопотеря или гемолиз Б. наследственный микросфероцитоз В. дефицит эритроцитарных ферментов Г. наследственная гипопластическая анемия | средний | 5,0 |
| ПК-6 | <i>Укажите один правильный ответ</i> Уровень прямого билирубина преобладает над содержанием непрямого билирубина: | А. при гемолитической анемии Б. болезни Минковского-Шаффера В. атрезии желчевыводящих путей | высокий | 8,0 |
| ПК-6 | <i>Укажите один правильный ответ</i> В неонатологии для усиления противомикробного эффекта стартовой терапии ампициллин применяют в сочетании: | А. с эритромицином Б. с гентамицином В. с тетрациклином Г. с сульфаниламидами | высокий | 8,0 |

| | | | | |
|------|---|--|---------|-----|
| ПК-6 | <p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>Новорожденным детям от матерей – носительниц HBs-антигена с профилактической целью показано введение специфического иммуноглобулина в следующие сроки:</p> | <p>А. в первые часы жизни</p> <p>Б. на 2-3-и сутки жизни</p> <p>В. при выписке из родильного дома</p> <p>Г. в возрасте 1 месяца жизни</p> | высокий | 8,0 |
| ПК-6 | <p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>Какие рентгенологические признаки являются абсолютными при пневмонии у новорожденного:</p> | <p>А. подчеркнута междолевая плевра</p> <p>Б. вздутие легких</p> <p>В. отсутствие четкого контура средостения или диафрагмы</p> <p>Г. инфильтративные изменения</p> <p>Д. гиповентиляция</p> | высокий | 8,0 |
| ПК-6 | <p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>Какая внутриутробная инфекция часто вызывает поражение глаз и требует обязательной консультации окулиста:</p> | <p>А. краснуха</p> <p>Б. токсоплазмоз</p> <p>В. цитомегалия</p> <p>Г. листериоз</p> <p>Д. герпес-инфекция</p> <p>Е. все перечисленное</p> | высокий | 8,0 |