

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 11.06.2024 09:20:21
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Инфекционные болезни

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Детских болезней
Выпускающая кафедра	Детских болезней

СЕМЕСТР 7

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Наиболее изменчивые вирусы гриппа:	А) вирус гриппа А Б) вирус гриппа В В) вирус гриппа С Г) вирусы всех трех групп (типов)	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Для экспресс-диагностики аденовирусной инфекции применяется реакция:	А) связывания комплемента Б) торможения гемагглютинации В) иммунофлюоресценции	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Степень стеноза гортани определяет:	А) наличие в легких влажных хрипов Б) степень дыхательной недостаточности В) шумное дыхание	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Симптомами аденовирусной инфекции являются:	А.) катаральные явления в ротоглотке, увеличение шейных лимфоузлов Б) боли в суставах, увеличение шейных лимфоузлов, узловатая эритема В) увеличение шейных лимфоузлов, узловатая эритема Г) конъюнктивит, увеличение шейных лимфоузлов, катаральные явления в ротоглотке	низкий
ОПК-4.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ	А) бронхолит	низкий

ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Тяжелые формы гриппа сопровождаются	Б) конъюнктивит В) диарея	
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Тяжелые формы гриппа сопровождаются	А) носовыми кровотечениями Б) снижением артериального давления В) высокой температурой Г) одышкой, кашлем Д) всем перечисленным	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Коронавирус - это:	А) РНК-содержащий вирус Б) ДНК-содержащий вирус В) относится к линии Beta-Cov-B Г) относится к линии Alfa-Cov-A	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: К специфической лабораторной диагностике коронавирусной инфекции относят:	А) выявление ДНК SARS-CoV методом ПЦР Б) выявление РНК SARS-CoV методом ПЦР В) обнаружение титров антител в парных сыворотках Г) бактериологический посев с ротоглотки	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Наиболее характерными клиническими симптомами коронавирусной инфекции являются:	А) повышение температуры тела Б) кашель В) диарея Г) одышка Д) олигурия Е) артралгии	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: При дифтерии ротоглотки отмечается увеличение регионарных лимфатических узлов. Это связано с развитием:	А) бактериального лимфаденита Б) токсического лимфаденита В) банального отека лимфатических узлов Г) гнойного расплавления в лимфатических узлах	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: При какой форме дифтерии развивается ранний токсический миокардит:	А) нисходящий дифтерийный круп Б) токсические формы дифтерии В) локализованные формы дифтерии зева Г) дифтерия кожи Д) дифтерия носа	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Геморрагическая сыпь при менингококцемии располагается на всей поверхности кожи больного.	А) на лице Б) на боковых поверхностях туловища В) на руках и груди Г) на ягодицах и ногах	средний

	Но обильнее всего она располагается:		
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Наиболее частой причиной смерти у больного с менингококковой инфекцией является:	А) менингит Б) менингоэнцефалит В) инфекционно-токсический шок Г) кровоизлияния в мозг	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: Область дифференциально-диагностического поиска при пневмококковой инфекции:	А) фелиноз Б) менингококковый менингит В) респираторная инфекция другой этиологии Г) пневмония, вызванная COVID 19 Д) дифтерия ротоглотки	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Для отека при роже характерны:	А) отслойка эпителия Б) образование пузырей различных размеров, заполненных серозным или геморрагическим содержимым В) наличие сопутствующих лимфангитов Г) мраморность кожи Д) все перечисленное	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Для местных проявлений при роже, в отличие от сибирской язвы, характерны:	А) четкие контуры воспалительной зоны Б) болезненность кожи по периферии воспаления В) наличие лимфаденита Г) отсутствие струпа Д) все перечисленное	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: При скарлатине возможно развитие всех перечисленных осложнений, кроме:	А) энцефалит Б) лимфаденит В) миокардит Г) гломерулонефрит	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Для скарлатины характерны следующие клинические симптомы	А) острое начало, лихорадка, интоксикация Б) озноб, головная боль, боль в горле, тонзиллит В) точечная сыпь на гиперемизированном фоне кожи со сгущением в естественных складках Г) шелушение кожи после угасания сыпи Д) все перечисленные	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: В какие сроки должно быть направлено экстренное извещение при выявлении	А) немедленно Б) 12 часов В) 1 суток Г) 2 суток Д) 7 суток	высокий

	инфекционного заболевания, не относящегося к особо опасным?		
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Назовите клинические формы рожи:	А) эритематозная Б) эритематозно-геморрагическая В) буллезная Г) буллезно-геморрагическая Д) все вышеперечисленные	высокий

СЕМЕСТР 8

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 1. Для возбудителя брюшного тифа характерно все, кроме:	А) относится к сальмонеллам группы Д Б) относится к сальмонеллам группы В В) возбудитель патогенный только для человека Г) спор и капсул не образует Д) образует эндотоксин	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 2. Развитие бактерионосительства при брюшном тифе определяет:	А) вирулентность возбудителя Б) наличие рецидивов заболевания В) индивидуальное несовершенство иммунитета Г) уменьшение продолжительности антибиотикотерапии Д) особенности репарационных процессов в кишечнике	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 3. Для брюшного тифа характерно:	А) постепенное начало болезни с максимальной выраженностью клинической симптоматики на 8-9 день Б) острое начало болезни В) наличие атипичных форм Г) частое выявление продромального периода Д) все перечисленное	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 4. Для паратифов А и В характерны все перечисленные клинические формы, кроме:	А) менингеальной Б) тифоидной В) гастроинтестинальной Г) катаральной или гриппоподобной Д) смешанной	низкий

ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 5. При неосложненной гастроинтестинальной форме сальмонеллеза наблюдаются все перечисленные симптомы, кроме:	А) высокой лихорадки, интоксикации Б) желтухи, геморрагического синдрома В) схваткообразных болей в животе Г) тошноты, рвоты, частого жидкого стула Д) обезвоживания	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 6. Критерии тяжести колитического варианта дизентерии:	А) высота и продолжительность лихорадки Б) гемодинамические расстройства В) степень интоксикации Г) частота и продолжительность жидкого стула, степень выраженности гемоколита Д) все перечисленное	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 7. К особенностям течения дизентерии лиц пожилого возраста относится все перечисленное, кроме:	А) более тяжелого течения заболевания Б) отсутствия колитического синдрома В) часто протекает на неблагоприятном фоне сопутствующих заболеваний Г) чаще наблюдается подострое и хроническое течение заболевания Д) все ответы правильные	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 8. Для ПТИ характерен путь передачи:	А) водный Б) алиментарный В) контактно-бытовой Д) воздушно-пылевой	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 9. Для ПТИ характерно:	А) острое начало Б) короткий инкубационный период до 24 часов Г) инкубационный период более 48 часов Д) легкое течение	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 10. Симптомами дистального колита являются:	А) тенезмы Б) схваткообразные боли в левой подвздошной области В) жидкий стул с прожилками крови, слизи Г) все перечисленное	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 11. Назовите вирусы, которые являются облигатно гепатотропными:	А) ВГА Б) ВГВ В) вирус Эпштейн-Барра Г) вирус простого герпеса	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:	А) больной в острый период заболевания Б) больной в преджелтушном периоде В) больной в период реконвалесценции	высокий

ОПК-6.1 ОПК-6.2	12. Источником инфекции при вирусном гепатите А является:	Г) больной хроническим гепатитом	
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 13. Назовите пути передачи вируса гепатита В	А) Ффкально-оральный Б) гемоконтактный при потреблении инъекционных наркотиков В) половой Г) гемоконтактный при медицинских вмешательствах Д) вертикальный Е) гемоконтактный при контакте с микрочастицами крови в быту	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 14. Какое заключение можно сделать, если у больного в крови выявлен HBsAg:	А) инфицированность ВГВ Б) хронический вирусный гепатит В В) острый вирусный гепатит В Г) острый вирусный гепатит С	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 15. Назовите критерии синдрома холестаза:	А) гипербилирубинемия за счет связанного билирубина Б) повышение активности Ф-1-Ф альдолазы В) повышение активности щелочной фосфатазы Г) кожный зуд Д) повышение активности кислой фосфатазы	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 16. Назовите признаки, которые могут наблюдаться при хроническом ВГВ:	А) гепатомегалия Б) спленомегалия В) появление анти-HBsAg Г) телеангиэктазии Д) диспротеинемия	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 17. Назовите характерные клинические симптомы фульминантной формы вирусного гепатита Дельта:	А) психомоторное возбуждение Б) уменьшение размеров печени В) нарастающая желтуха Г) большие размеры печени Д) анемия Е) инверсия сна	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2	УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 18. При развитии геморрагического синдрома у больных с острой печеночной недостаточностью какие препараты используются:	А) УМАНА-комплекс Б) викасол В) свежзамороженная плазма Г) криопреципитат Д) гемотрансфузии	высокий

<p>ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2</p>	<p>УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 19. Укажите дифференциально- диагностические признаки цирроза печени:</p>	<p>А) дистрофия гепатоцитов Б) расширение портальных трактов В) узловая регенерация печеночной ткани Г) соединительнотканые междольевые септы Д) ступенчатые некрозы</p>	<p>высокий</p>
<p>ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2</p>	<p>УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 20. Какие клинико- лабораторные проявления характерны для суперинфекции вирусом гепатита дельта?</p>	<p>А) острое начало заболевания Б) появление желтухи В) гепатолиенальный синдром Г) гиперферментемия Д) гиперхолестеринемия</p>	<p>высокий</p>